

のびやすく、塗りやすい乳剤性軟膏

外用湿疹・
皮膚炎用薬

新レスタミン^γ軟膏

湿疹や皮膚炎、かゆみなどの治療には、皮膚科領域を中心に
外用のジフェンヒドラミン製剤が使用されています。

新レスタミン^γ軟膏には、有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩
が、OTC医薬品としての配合上限量である2.0%処方されてお
ります。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、かゆみなどのもとであるヒスタミ
ンの働きをおさえて、かゆみをおさえると同時に、湿疹や皮膚炎
などにすぐれた効きめをあらわします。

また、本剤はやわらかく、のびやすい乳剤性軟膏です。ですから、
かゆみなどの広い患部にも塗り広げやすく、使用感のよいお薬と
なっております。その上、本剤は無香料・無着色・低刺激性です。

湿疹や皮膚炎などは、掻くことによって悪化してしまうことも
あります。本剤をご家庭に常備して、皮膚がかゆくなったり、赤い
ポツポツ、ブツブツなどの症状が出たら早めにご使用ください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この
添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 (1g中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg	湿疹やかゆみ等のもとになるヒスタミン の働きをおさえ、湿疹やかゆみ等にすぐ れた効きめがあります。

〔添加物〕ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、
グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、カルボキシビニルポリマー、
キサンタンガム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、
ステアリン酸ソルビタン、エドト酸Na、パラベン、クエン酸、水酸化Na

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん




用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

●容器の正しい使い方

		
1.まずキャップをはずして、キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてください。	2.やわらかい乳剤性軟膏のため、チューブを軽く押して適量を取り出し、お使いください。	3.使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

※使用後はチューブの口元をきれいに拭きとり、乳剤性軟膏がまわりに付着しないように注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造 興和株式会社
販売 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14